

Uso del distanziatore (spacer) per l'aerosol:

Per **lattanti** e **bambini** piccoli viene usato un distanziatore con una **maschera** di misura adeguata:



Appena i bambini sono in grado di farlo, fanno l'aerosol con il distanziatore con il **boccaglio**:



Questo è un **aerosol predosato**:



Il medicinale per l'aerosol si trova in un recipiente a pressione che è collocato in un contenitore di plastica.

Prima dell'uso si toglie il cappuccio protettivo e si scuote l'aerosol predosato per circa 5 volte.

Poi l'apertura del contenitore di plastica viene inserito nell'apposita apertura del distanziatore e tramite pressione sul recipiente a pressione il medicinale entra nel distanziatore.

Prima di incominciare la terapia il distanziatore **viene "caricato" con 2 puff dell'aerosol predosato.**

Il dosaggio, la frequenza e durata dell'aerosol vengono prescritti dal medico.

Si deve considerare che: **1 puff = scuotere l'aerosol predosato, spruzzare, il bambino deve respirare 5-10x tramite maschera o boccaglio del distanziatore, possibilmente lentamente, con una breve pausa dopo l'inspirio.**

Dopo l'aerosol è utile mangiare qualcosa, così vengono rimossi eventuali resti di medicinale in bocca.

Appena il bambino è guarito e la terapia è conclusa, il distanziatore viene lavato con un **detergente per lavastoviglie**, lasciato **asciugare all'aria** e conservato in un luogo asciutto, protetto dalla polvere

L'uso successivo inizia di nuovo con la "carica" del distanziatore con 2 puff dell'aerosol predosato...